

임신 소에 유산과 조산을 일으키는 소 브루셀라병! 철저히 예방합시다!

소 브루셀라병 방역 관리 이렇게!



소 브루셀라병 이란?

- 브루셀라균에 의해 소에 감염되는 2종 가축전염병으로 사람에도 감염되는 인수공통전염병
- 생식기 염증을 유발해 주로 임신 말기 (6~9개월)에 유산과 조산을 일으킴
- 감염가축의 출산부산물(양수, 태반 등), 비기열 우유, 오염된 사료, 물 등의 섭취에 의한 경구감염
- 감염가축과의 교미에 의한 생식기 감염 및 점막, 결막, 상처난 피부를 통한 접촉감염
- 소 브루셀라병의 잠복기는 보통 1~2개월이나, 12개월 이상도 가능

소 브루셀라병 예방요령




정기적(1회 이상/주)
청소, 소독



외부인·외부차량 출입
통제 및 담장 설치



출입 및 소독기록부
농장내 비치·기록



임신소는 주의깊게 관찰
유·사산 발생 시 신고

소 브루셀라병 발생 시 농장 전체 청소·세척·소독 실시 재입식전 30일 동안 주 2회 이상 소독



감염(의심)소 발생 시 우선 조치사항

- ✓ 유·사산한 소가 있을 경우에도 별도의 축사에 격리
- ✓ 유·사산태아, 태반 등은 다른 소들과 접촉하지 않도록 비닐장갑 활용해 위생처리
- ✓ 즉시 소독 후 소각(매몰) 폐기, 유산물 주변 환경 소독
- ✓ 관찰 사·도 가축방역기관에 병성감정 의뢰

가축
브루셀라병
의심 신고



농림축산검역본부 및 지자체

1588-4060/9060

사람
브루셀라증
의심 신고



질병관리청 및 보건소

국번없이 1339



농림축산식품부



전국한우협회



대한축산농업협회

인우자조금관리위원회



우유자조금관리위원회